

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

AUDIT är tänkt att identifiera personer med högkonsumtion eller riskkonsumtion av alkohol. AUDIT är inte ett diagnostiskt instrument som t ex SCID. AUDIT kan identifiera personer med riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion liksom även alkoholberoende.

Svaren poängsätts med 0-4 poäng (från vänster till höger) med undantag de två sista frågorna (fråga 9 och 10) där svarsalternativen ges 0p, 2p respektive 4 poäng. Finns dock två olika layouter, en med poängen inom parentes och en med svarsalternativ som tolkas från vänster till höger.

Fråga nr 1 t om 8

1. Hur ofta dricker Du alkohol?	Aldrig	1 gång i månaden eller mer sällan	2-4 gånger i månaden	2-3 gånger i veckan	4 gånger/vecka eller mer
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poängsätts	0 p	1	2	3	4

—————→

Fråga nr 9 och 10

Svarsalternativen ges 0p, 2p respektive 4 poäng

9. Har Du eller någon annan blivit skadad på grund av Ditt drickande?	Nej	Ja, men inte under det senaste året	Ja, under det senaste året
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poängsätts	0 p	2 p	4 p

Maxpoängen blir 40 poäng. minimum 0 p

Tolkas: Får en manlig patient 8 poäng eller mer föreligger sannolikt riskabla eller skadliga alkoholvanor. Motsvarande poäng för kvinnliga patienter är 6 poäng.

Om man identifierar en person med högt poängantal i AUDIT, särskilt beroende delen (frågorna 4-6) och/eller skadedelen (frågorna 7-10) bör man gå vidare med en fördjupad problembedömning, dvs närmare utreda alkoholproblematiken eller remittera klinten för specialistbedömning.

Källa Berman & Källmén 2003

På uppdrag för klinikledningen den 11 juli 2006-07-11
Tord Forsner